

MENINGITIS MED MENINGOKOKKER

DRÅBESMITTE

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion. Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion. Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

RØD
ISOLATION

INFLUENZA

LUFTBÅREN SMITTE. DIREKTE OG INDIREKTE SMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion. Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion. Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

RØD
ISOLATION

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

DIREKTE OG INDIREKTE SMITTE. FÆKAL-ORAL SMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres altid når værnemidler aftages. Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: ActiChlor Plus 1000 ppm eller godkendte klorklude.

GUL
ISOLATION

MRSA (METHICILLINRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS)

DIREKTE OG INDIREKTE SMITTE. DRÅBESMITTE VED LUFTVEJSINFEKTION.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion. Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion. Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

GUL
ISOLATION

RØD
ISOLATION

VIRAL GASTROENTERITIS

FÆKAL-ORAL KONTAKTSMITTE. DRÅBESMITTE VED OPKAST.

HÅNDHYGIEJNE

Patienter tilbydes hjælp til håndvask før måltider og efter toiletbesøg og opkastninger. Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres altid når værnemidler aftages. Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: ActiChlor Plus 1000 ppm, eller klorklude 1000 ppm.

GUL
ISOLATION

RØD
ISOLATION

(Ved eksplosiv opkast)

VÆRNEMIDLER

GUL
ISOLATION

=

HANDSKER
FORKLÆDE

RØD
ISOLATION

=

HANDSKER
FORKLÆDE
MASKE



BAR transport og engros

Forholdsregler ved transport af risikopatienter udarbejdet af brancheudvalget for brand og redning.

Version 1.0 | 06/05/2014

VRE (VANCOMYCIN RESISTENTE ENTEROKOKKER)

DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

GUL
ISOLATION

RSV (RESPIRATORISK SYNCIAL VIRUS)

DRÅBESMITTE. DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

GUL
ISOLATION

SKORPEFNAT (NORSK FNAT)

DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Vask hænder og underarme efterfølges af hånddesinfektion.
Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

GUL
ISOLATION

ESBL

DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE. SJÆLDNERE DRÅBESMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

(Ved luftvejsinfektion)

GUL
ISOLATION

RØD
ISOLATION

LUNGETUBERKULOSE

DRÅBESMITTE. LUFTBÅREN SMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70 %. Alternativt kan anvendes godkendt klor produkt.

RØD
ISOLATION

CORONAVIRUS (MERS-COV) SÆRLIG SMITSOM LUFTVEJSINFEKTION

LUFTBÅREN SMITTE. DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKTSMITTE.

HÅNDHYGIEJNE

Ved synlig forurening udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
Ved synlig rene og tørre hænder udføres hånddesinfektion.
Håndhygiejne udføres af alle, når isolationsenheden forlades.

RENGØRING OG DISINFEKTION

Desinfektionsmiddel: ActiChlor Plus 1000 ppm, eller klorklude 1000 ppm.

RØD
ISOLATION